MDI Limbach
BERLIN

## Vergleich der Referenzbereiche (5.–95. Perzentile) in *µg/dL* (konventionell)

| | Generation I | | Generation II | |
|---|---|---|---|---|
| **Gruppe** | **Altersgruppe** | **Referenzbereich** | **Altersgruppe** | **Referenzbereich** |
| Kinder (m/w) | < 1 Woche | 108–607 | – | nicht angegeben |
| Kinder (m/w) | 1–4 Wochen | 31,6–431 | – | nicht angegeben |
| Kinder (m/w) | 1–12 Monate | 3,4–124 | 9 – < 12 Monate | < 3,00–74,8 |
| Kinder (m/w) | 1–4 Jahre | 0,47–19,4 | 1–4 Jahre | < 3,00–62,4 |
| Kinder (m/w) | 5–9 Jahre | 2,8–85,2 | (siehe Frauen / Männer) | (getrennt ausgewiesen) |
| Frauen | (siehe Kinder 5–9 J.) | (2,8–85,2) | 5–9 Jahre | 4,02–167 |
| Frauen | 10–14 Jahre | 33,9–280 | 10–14 Jahre | 4,30–267 |
| Frauen | 15–19 Jahre | 65,1–368 | 15–20 Jahre | 14,0–289 |
| Frauen | 20–24 Jahre | 148–407 | 21–30 Jahre | 44,8–296 |
| Frauen | 25–34 Jahre | 98,8–340 | 31–40 Jahre | 17,1–247 |
| Frauen | 35–44 Jahre | 60,9–337 | 41–50 Jahre | 20,8–204 |
| Frauen | 45–54 Jahre | 35,4–256 | ≥ 51 Jahre | 9,40–149 |
| Frauen | 55–64 Jahre | 18,9–205 | ≥ 51 Jahre | 9,40–149 |
| Frauen | 65–74 Jahre | 9,40–246 | ≥ 51 Jahre | 9,40–149 |
| Frauen | ≥ 75 Jahre | 12,0–154 | ≥ 51 Jahre | 9,40–149 |
| Männer | (siehe Kinder 5–9 J.) | (2,8–85,2) | 5–9 Jahre | < 3,00–157 |
| Männer | 10–14 Jahre | 24,4–247 | 10–14 Jahre | 8,62–295 |
| Männer | 15–19 Jahre | 70,2–492 | 15–20 Jahre | 25,7–368 |
| Männer | 20–24 Jahre | 211–492 | 21–50 Jahre | 42,0–378 |
| Männer | 25–34 Jahre | 160–449 | 21–50 Jahre | 42,0–378 |
| Männer | 35–44 Jahre | 88,9–427 | 21–50 Jahre | 42,0–378 |
| Männer | 45–54 Jahre | 44,3–331 | ≥ 51 Jahre | 20,8–211 |
| Männer | 55–64 Jahre | 51,7–295 | ≥ 51 Jahre | 20,8–211 |
| Männer | 65–74 Jahre | 33,6–249 | ≥ 51 Jahre | 20,8–211 |
| Männer | ≥ 75 Jahre | 16,2–123 | ≥ 51 Jahre | 20,8–211 |

MDI Limbach
BERLIN

## Vergleich der Referenzbereiche (5.–95. Perzentile) in *µmol/L* (SI)

| | Generation I | | Generation II | |
|---|---|---|---|---|
| **Gruppe** | **Altersgruppe** | **Referenzbereich** | **Altersgruppe** | **Referenzbereich** |
| Kinder (m/w) | < 1 Woche | 2,93–16,5 | – | *nicht angegeben* |
| Kinder (m/w) | 1–4 Wochen | 0,86–11,7 | – | *nicht angegeben* |
| Kinder (m/w) | 1–12 Monate | 0,09–3,35 | 9 – < 12 Monate | < 0,0814–2,03 |
| Kinder (m/w) | 1–4 Jahre | 0,01–0,53 | 1–4 Jahre | < 0,0814–1,69 |
| Kinder (m/w) | 5–9 Jahre | 0,08–2,31 | *(siehe Frauen / Männer)* | *(getrennt ausgewiesen)* |
| Frauen | *(siehe Kinder 5–9 J.)* | *(0,08–2,31)* | 5–9 Jahre | 0,109–4,53 |
| Frauen | 10–14 Jahre | 0,92–7,60 | 10–14 Jahre | 0,117–7,25 |
| Frauen | 15–19 Jahre | 1,77–9,99 | 15–20 Jahre | 0,380–7,84 |
| Frauen | 20–24 Jahre | 4,02–11,0 | 21–30 Jahre | 1,22–8,04 |
| Frauen | 25–34 Jahre | 2,68–9,23 | 31–40 Jahre | 0,464–6,71 |
| Frauen | 35–44 Jahre* | 1,65–9,15 | 41–50 Jahre | 0,566–5,53 |
| Frauen | 45–54 Jahre* | 0,96–6,95 | ≥ 51 Jahre | 0,255–4,04 |
| Frauen | 55–64 Jahre | 0,51–5,56 | ≥ 51 Jahre | 0,255–4,04 |
| Frauen | 65–74 Jahre | 0,26–6,68 | ≥ 51 Jahre | 0,255–4,04 |
| Frauen | ≥ 75 Jahre | 0,33–4,18 | ≥ 51 Jahre | 0,255–4,04 |
| Männer | *(siehe Kinder 5–9 J.)* | *(0,08–2,31)* | 5–9 Jahre | < 0,0814–4,27 |
| Männer | 10–14 Jahre | 0,66–6,70 | 10–14 Jahre | 0,234–8,01 |
| Männer | 15–19 Jahre | 1,91–13,4 | 15–20 Jahre | 0,698–9,99 |
| Männer | 20–24 Jahre | 5,73–13,4 | 21–50 Jahre | 1,14–10,3 |
| Männer | 25–34 Jahre | 4,34–12,2 | 21–50 Jahre | 1,14–10,3 |
| Männer | 35–44 Jahre | 2,41–11,6 | 21–50 Jahre | 1,14–10,3 |
| Männer | 45–54 Jahre | 1,20–8,98 | ≥ 51 Jahre | 0,564–5,72 |
| Männer | 55–64 Jahre | 1,40–8,01 | ≥ 51 Jahre | 0,564–5,72 |
| Männer | 65–74 Jahre | 0,91–6,76 | ≥ 51 Jahre | 0,564–5,72 |
| Männer | ≥ 75 Jahre | 0,44–3,34 | ≥ 51 Jahre | 0,564–5,72 |